






LUK IZ SJEMENA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
NAKON NIKANJA KULTURE (POST-EM) KADA SE KULTURA NALAZI U STADIJU RAZVOJA "BIČA" (BBCH 10)	■ STOMP AQUA 2,5 - 3,0 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	75 dana
KAD LUK DOBIJE PRVE LISTOVE I VOŠTANU PREVLAKU 	■ STARANE 250 EC 0,5 l/ha (dvokratna primjena)	širokolisne korove	70 dana za glavice luka
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 0,75 - 1,0 kg/ha	sivu plijesan, pepelnicu	21 dana
POJAVA ŠTETNIKA 	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša i sovice	7 dana
	■ ROTOR SUPER 300 - 500 ml/ha uz utrošak vode 400 - 500 l/ha	uhanov resičar (trips), sovice pozemljuše	7 dana



NAPOMENA:

POLYRAM DF se može primjenjivati u vlasцу na otvorenom u količini 1,2 kg/ha.
CUPRABLAU Z se može primjeniti za luk kozjak i češnjak u količini 1,8 kg/ha.