


GRAH I GRAŠAK

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
NAKON SJETVE, PRIJE NICANJA	■ STOMP AQUA 2,5 - 3,0 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	OVP
U FAZI RAZVOJA 4. LISTA KULTURE (BBCH 14)	■ BASAGRAN 480 150 - 200 ml u 20 - 40 l vode) jednokratno ■ BASAGRAN 480 150 - 200 ml u 20 - 40 l vode na 1000 m ² u split aplikaciji (prilikom upotrebe sredstva utrošiti najmanje 200 l vode/ha; preporučuje se dodati okvašivač)	jednogodišnje širokolisne korove	OVP
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ CUPRABLAU Z 35 WG 0,66 - 1,5 kg (66 - 150 g u 30 - 80 l vode na 1000 m ²)	plamenjaču	3 dana
	■ CHROMOSUL 80 3 kg/ha uz utrošak vode 500 - 1000 l/ha (300 g u 50 - 100 l vode na 1000 m ²)	pepelnicu	14 dana
	■ SIGNUM 1,0 kg/ha (dozvoljeno samo u grahu)	sivu plijesan, hrđu graha	21 dan
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana za grah, 14 dana za grašak
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša, sovice	
	■ FASTAC 10 EC 0,125 l/ha	prugaste pipe mahunarke	
	■ FASTAC 10 EC 0,1 l/ha	crnog graškovog savijača	
	■ ROTOR SUPER 300 - 500 ml/ha uz utrošak vode 500 - 1000 l/ha	žutu kukuruznu sovica, zelenu breskvinu uš, lisne uši, sovice pozemljuše	7 dana
	■ PIRIMOR 50 WG 0,04 - 0,06 % (40 - 60g na 100 l vode)	lisne uši	14 dana

ROTOR® SUPER (deltametrin 25 g/l)

KONTAKTNO-ŽELUČANI INSEKTIKID

ROTOR® SUPER namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:

grahu, bobu

– žute kukuruzne sovice, zelene breskvine uši, te sovice pozemljuše u količini 300–500 ml/ha uz utrošak vode 500–1000 l/ha kod pojave štetnika.


grašku

- zelene graškove uši i pipe mahunarke u količini 250 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
- crne repine uši, crnog graškovog savijača, tripsa i sovice u količini 300–500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.

Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.



zelena
graškova uš



pipa mahunarka
na listu graška



GRAH I GRAŠAK

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



STOMP AQUA® (pendimetalin 455 g/l)

STOMP AQUA® je namijenjen za suzbijanje **jednogodišnjih uskolisnih korova** u:

grašku - prije sjetve kulture uz inkorporaciju u količini 2,0 – 2,5 l/ha ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,5 – 3,0 l/ha.

grašku (namijenjenom za sušenje) - smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim travnim korovima, primjenjuje se prije sjetve kulture uz inkorporaciju ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture u količini 2,0 – 2,5 l/ha. Utrošak vode je 200 – 600 l/ha.

KONTAKTNO-ZEMLJIŠNI HERBICID



muhar



mišji repak

BASAGRAN® 480 (bentazon 480 g/l)

BASAGRAN® 480 namijenjen je za suzbijanje **jednogodišnjih širokolisnih korova** u:

grahu i grašku - u fazi razvoja 4. lista (BBCH 14) u količini od 1,5 – 2 l/ha (150 – 200 ml sredstva u 20 – 40 l vode na 1.000 m²).

Za postizanje najvećeg učinka, preporuča se kod prskanja osigurati dobru pokrovnost listova i stabiljike korove škropiva.

Zbog nejednoličnog nicanja korova i to kod nižih temperature (max. 22 – 23 °C) uz maksimalan utrošak vode 200 – 250 l/ha preporuča se dvokratno tretiranje (split aplikacija).

KONTAKTNI HERBICID



loboda



dvornik

FASTAC® 10 EC (alfa-cipermetrin 100 g/l)

FASTAC® 10 EC je namijenjen za suzbijanje **štetnih kukaca** u:

grahu i grašku - **cvjetnog štitastog moljca** i **duhanovog štitastog moljca** u količini 300 ml/ha, **lisnih uši** 150 ml/ha, **gusjenica sovice pozemljuša** i **lisnih sovice** 150 ml/ha, **prugaste pipe mahunarke** 125 ml/ha te **crnog graškovog savijača** u količini 100 ml/ha.

Za suzbijanje sovice pozemljuša primjenjuje se predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja.

Za suzbijanje svih navedenih štetnika može se primijeniti do 2 puta godišnje na istoj površini, osim kod suzbijanja cvjetnog štitastog moljca i duhanovog štitastog moljca gdje je dozvoljena jedna primjena godišnje.

KONTAKTNI INSEKTICID IZ SKUPINE PIRETROIDA



pipa mahunarka
na listu graška



zelena lisna uš