








# KRUMPIR

## ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
<b>NAKON SADNJE, PRIJE NICANJA KRUMPIRA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>SIRTAKI</b> 0,25 – 0,3 l/ha (25 – 30 ml/1000 m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<p>jednogodišnje širokolisne korove i pojedine jednogodišnje uskolisne korove</p>
<b>NAKON NICANJA</b> (kada je krumpir visine 10-15cm, a korovi imaju 2 lista) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>BASAGRAN 480</b> 2 l/ha (u split aplikaciji)</li> </ul>	<p>sjemenske jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim višegodišnjim širokolisnim korovima</p>
<b>PRIJE POJAVE BOLESTI</b> (dok je cima još mala) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CUPRABLAU Z</b> 3 – 4 kg/ha ili</li> <li>■ <b>CUPRABLAU Z 35 WG</b> 1,7 – 2,1 kg/ha</li> <li>■ <b>POLYRAM DF</b> 1,8 kg/ha ili</li> <li>■ <b>STAR 80 WP</b> 2 kg/ha ili</li> <li>■ <b>ELECTIS WG</b> 1,8 – 2 kg/ha ili</li> <li>■ <b>REBOOT</b> 0,45 kg/ha</li> <li>■ <b>SIGNUM</b> 0,25 kg/ha</li> </ul>	<p>plamenjaču krumpira</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>REBOOT</b> 0,45 kg/ha ili</li> <li>■ <b>ELECTIS WG</b> 1,8 – 2 kg/ha</li> <li>■ <b>ARGO</b> 0,4 – 0,5 l/ha ili</li> <li>■ <b>SIGNUM</b> 0,25 kg/ha</li> </ul>	<p>koncentričnu pjegavost lista</p>
<b>PRED CVATNJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>REBOOT</b> 0,45 kg/ha ili</li> <li>■ <b>ELECTIS WG</b> 1,8 – 2 kg/ha</li> <li>■ <b>ARGO</b> 0,4 – 0,5 l/ha ili</li> <li>■ <b>SIGNUM</b> 0,25 kg/ha</li> </ul>	<p>plamenjaču krumpira</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>REBOOT</b> 0,45 kg/ha ili</li> <li>■ <b>ELECTIS WG</b> 1,8 – 2 kg/ha</li> <li>■ <b>ARGO</b> 0,4 – 0,5 l/ha ili</li> <li>■ <b>SIGNUM</b> 0,25 kg/ha</li> </ul>	<p>koncentričnu pjegavost lista</p>
<b>KOD POJAVE KRUMPIROVE ZLATICE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha</li> </ul>	<p>krumpirovu zlaticu</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ROTOR SUPER</b> 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha 500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha**</li> </ul>	<p>sovicu (<i>Spodoptera littoralis</i>) krumpirovu zlaticu</p>



### NAPOMENA:

\*\* Primjenjuje se samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide.