




MRKVA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
NAKON SJETVE, PRIJE NICANJA	■ STOMP AQUA 2,0 - 2,5 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	90 dana
DO STADIJA 2 PRAVA LISTA (BBCH 12)	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 - 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	OVP
KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI 	■ ARGO 0,4 - 0,5 l/ha	hrđu, pepelnicu, palež	14 dana
	■ SIGNUM 0,75 - 1,0 kg/ha	palež lista i pepelnicu	14 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ PIRIMOR 50 WG 0,04 - 0,06 % (40 - 60g na 100 l vode)	lisne uši	14 dana



NAPOMENA:

- POLYRAM DF se može primjenjivati u peršinu i celeru korijenašu u količini 1,8 kg/ha.



PREPORUKA:

ARGO[®] (difenkonazol 250 g/l)

ARGO[®] je namijenjen za suzbijanje bolesti:

mrkve

- koncentrične pjegavosti, pjegavosti lišća, hrđe, pepelnice i paleži u količini 0,4 - 0,5 l/ha.

sredstvo se primjenjuje preventivno 3-4 puta tijekom vegetacije u razmacima od 7-14 dana, ovisno o intenzitetu bolesti.

SISTEMIČNI FUNGICID IZ SKUPINE TRIAZOLA



simptomi pepelnice
na listu mrkve



simptomi paleži
na listu mrkve

SIGNUM[®] (piraklostrobin 6,7% + boskalid 26,7%)

SIGNUM[®] je namijenjen za suzbijanje bolesti:

mrkve

- paleži lista i pepelnice u količini 0,75 - 1,0 kg/ha u 400 l vode.

KOMBINIRANI, KONTAKTNO-SISTEMIČNI FUNGICID



simptomi pepelnice
na listu mrkve



simptomi paleži
na listu mrkve