



PAPRIKA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NIKANJA DO PRESAĐIVANJA RASADA	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 – 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	35 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ PUŽOMOR 3 – 5 g/m ²	sve vrste puževa	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO	■ CHROMOSUL 80 3 kg / ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha	pepelnicu	OVP
	■ STROBY WG 0,02 – 0,05% (20 – 50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 0,1 – 0,15% (10 – 15 g na 10 l vode)	pepelnicu, sivu plijesan	7 dana za sorte slatke paprike, 21 dan za ljute sorte paprike
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovica, gusjenica sovica pozemljuša	7 dana
	■ ROTOR SUPER 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha 180 – 300 ml/ha uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha	žutu kukuruznu sovicu, sovice, krumpirovu zlaticu, lisne uši, sovice pozemljuše zelenu stjenicu / stjenicu Nezara viridula	3 dana

**NAPOMENA:**Sredstvo ROTOR SUPER može se primijeniti na paprici u zaštićenom prostoru za suzbijanje **stakleničkog štitastog moljca**.