



SALATA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 – 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	OVP
PRIJE PRESADIVANJA	■ STOMP AQUA 2,5 - 3,0 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	OVP
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ POLYRAM DF 1,2 kg/ha	plamenjaču	21 dan
	■ CHROMOSUL 80 4 kg/ha (400 g u 50 – 100 l vode na 1000 m ²)	pepelnicu	OVP
	■ CUPRABLAU Z 35 WG 0,66 – 1,5 kg (66 – 150 g u 30 – 60 l vode na 1000 m ²)	plamenjaču, smeđu pjegavost, koncentričnu pjegavost, bakterijsku pjegavost i palež	7 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 1 kg/ha	bijelu trulež i sivu plijesan	14 dana
	■ AVI WG 2,5 – 3,7 kg/ha	plamenjaču	14 dana
	■ AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha ili ■ BOMBARDIER 3 l/ha	biostimulator - smanjuje utjecaj stresa i pospješuje vegetativni rast	–
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovica, gusjenica sovica pozemljuša	7 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitaštog moljca, duhanovog štitaštog moljca	7 dana
	■ ROTOR SUPER 250 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha	žutu kukuruznu sovicu karadrinu, sovice, salatnu lisnu uš lisne uši (<i>Aphis</i> spp.) lisnu uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)	3 dana
	300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha ■ PIRIMOR 50 WG 0,04 – 0,06 % (40 – 60g na 100 l vode)	sovice pozemljuše lisne uši	14 dana

ROTOR® SUPER (deltametrin 25 g/l)

KONTAKTNO-ŽELUČANI INSEKTICID

ROTOR® SUPER namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:

zelenoj salati na otvorenom

– žutu kukuruznu sovicu, karadrinu, sovice, salatne lisne uši, te lisne uši (*Aphis* spp., *Hyperomyzus lactucae*) u količini 250–500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha kod pojave štetnika.

– sovice pozemljuše u količini 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha kod pojave štetnika.

Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

CHROMOSUL® 80 (sumpor 80%)

KONTAKTNI PREVENTIVNI FUNGICID

CHROMOSUL® 80 namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:

povrtlarskih kultura

– pepelnice u koncentraciji 0,25 – 0,3% (25 – 30 g u 10 l vode).

Prednosti ovog sredstva su: jednostavna primjena bez prašenja, lako doziranje, brzo otapanje u vodi, ne taloži se u prskalici, ne stvara pjenu, ne uzrokuje ožegotine na listovima (izbojima) i nije štetan za pčele. Najbolje rezultate CHROMOSUL® 80 ostvaruje ako se koristi preventivno (prije početka razvoja bolesti). Sredstvo se smije primijeniti 8 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 do 10 dana između primjena.

PUŽOMOR (metaldehid 6,6%)

LIMACID

PUŽOMOR je namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću:

rasipanjem mamaca po tlu i između biljaka (ne na biljke) u količini 30 – 40 kg/ha kod jakih napada i 6 kg/ha kod slabijih napada.