







KUKURUZ

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
NAKON SJETVE, PRIJE NICANJA	■ STOMP AQUA 2,5 - 3,0 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima
OD SJETVE DO 4 LISTA KUKURUZA 	■ DEHERBAN A EXTRA 1 - 1,2 l/ha ■ XTENDER ROW 5 l/ha	jednogodišnje širokolisne korove biostimulator - regenerator mikrobiote tla
KOREKTIVNO PRSKANJE (od 3-6 listova kukuruza) 	■ BASAGRAN 480 2 l/ha iii ■ STARANE FORTE 0,6 l/ha iii ■ KOLO 480 S 0,5 - 0,7 l/ha ■ NICOSH 1,0 l/ha	jednogodišnje širokolisne korove jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke jednogodišnje širokolisne korove
CILJANO PRSKANJE (od 3-6 listova kukuruza) 	■ NICOSH 1,0 l/ha + ■ KOLO 480 S 0,5 - 0,7 l/ha iii ■ NICOSH 1,0 l/ha + ■ STARANE FORTE 0,6 l/ha ■ AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha iii ■ BOMBARDIER 3 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke jednogodišnje širokolisne korove svaka od ovih kombinacija suzbija gotovo sve najvažnije jednogodišnje i višegodišnje korove u kukuruzu biostimulator - smanjuje utjecaj stresa, povećava kvalitetu plodova i pospješuje vegetativni rast
PRIJE CVATNJE (do BBCH 59) 	■ ROTOR SUPER 300 - 500 ml/ha ■ ROTOR SUPER 500 ml/ha ■ FASTAC 10 EC 0,15 - 0,3 l/ha	kukuruznog moljca, kukuruznu sovicu, žutu kukuruznu sovicu, sovice, sovice pozemljuše, sremzinu lisnu uš, zobenu lisnu uš kukuruznu zlaticu kukuruzne sovice



NAPOMENA:

- u sušnom proljeću preporuča se prskanje herbicidima prije nicanja uz obaveznu inkorporaciju u tlo na dubinu 2-3 cm.
- kombinaciji sredstva NICOSH s drugim herbicidima preporuča se dodavati okvašivač
- u stresnim uvjetima tijekom vegetacije (prije mraza, nakon tuče, suša, nakon duljeg perioda hladnijeg vremena) preporučamo koristiti biostimulatore AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha ili BOMBARDIER 3 l/ha





KUKURUZ

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



NICOSH® (nikosulfuron 40 g/l)

NICOSH je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih širokolisnih korova (divljeg sirka, koštana, sivog muhara, svračice, pirike, crvene mrtve koprive, šćira, lobode, divlje zobi, europskog mračnjaka, crne pomoćnice, srednje mišjakinje) u:

kukuruzu za zrno i silažu nakon nicanja (post-em) u količini 1 l/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (10 ml u 2 – 4 l vode na 100 m²) u stadiju razvoja kukuruza 3 – 6 listova (BBCH 13 – 16).

Korovi ga usvajaju preko lisne mase i korijena (ukoliko ima dovoljno vlage u zemljištu), nakon čega se brzo translocira ksilemom i floemom. Kod uskolisnih korova dolazi do pojave crvenila i nekroze, a kod osjetljivih širokolisnih korova do zadebljanja i deformacije tvornog tkiva (meristemskog tkiva).

Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

SISTEMIČNI HERBICID



divlji sirak



loboda

KOLO 480 S (dikamba 480 g/l)

KOLO 480 S namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) u količini 0,5 – 0,7 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (50 – 70 ml u 20 – 40 l vode na 1000 m²), primjenom nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3 – 5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u trake kada se prska pojas unutar reda kukuruza širine 25 – 30 cm uz međurednu kultivaciju.

KOLO 480 S je translokacijski herbicid kojeg biljke upijaju preko lista i korijena.

Na istoj površini koristi se jedanput godišnje.

SELEKTIVAN SISTEMIČNO KONTAKTNI HERBICID



obični kostriš



šćir



KUKURUZ

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



DEHERBAN® A EXTRA (2,4 – D (2,4 – diklorfenoksi) octena kiselina 600 g/l)

DEHERBAN® A EXTRA namijenjen je za suzbijanje **jednogodišnjih širokolisnih korova** (pelinolisne ambrozije, mišjakinje, dvornika, lobode, divlje lobode, poljske gorušice, običnog kostriša, divlje rotkve, poljskog maka, ruomače, običnog svinjaka, šćireva i dr.) te **višegodišnjih širokolisnih korova** (poljskog osjaka, sivkaste grbice te uz djelomičnu regeneraciju poljskog slaka i kudrave kiselice) u:

kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu (bez podusjeva) – u količini 1,0 – 1,2 l/ha (100 – 120 ml u 20 – 40 l vode na 1000 m²) primjenom u stadijima razvoja 3 – 4 lista kukuruza (BBCH 13 – 14) tj. kada je kukuruz visok 15 – 20 cm.

Sredstvo DEHERBAN® A EXTRA smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.

SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID



puzajući dvornik



osjak

STARANE™ FORTE (fluroksipir 333 g/l, što odgovara fluroksipir-meptil 480 g/l)

STARANE™ FORTE namijenjen je za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova** (maslačka, rusomače, slaka, dimnjače, smrdelji, bročike, mrtve koprive, poljske potočnice, slakastog dvornika, ptičjeg dvornika, tušnja, divlje kupine, šćava, kostriša, crne pomoćnice, mišjakinje, poljske čestitke, koprive, grahorice) u:

kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu – u količini 0,6 l/ha (60 ml/1000 m²) nakon nicanja (post-em) od stadija prvih listova kroz koleoptilu do stadija razvoja 5 listova kukuruza (BBCH 10-15).

STARANE™ FORTE smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija), sukladno odobrenoj primjeni).

SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID



dvornik



ambrozija

