





# ŠEĆERNA REPA

## ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
<b>U VRIJEME POJAVE ŠTETNIKA</b> 	■ <b>MAVRIK 2 F</b> 0,2 l/ha	crnu repinu uš
	■ <b>PIRIMOR 50 WG</b> 4 – 6 g u 10 l (40 – 60g u 100 l vode)	lisne uši
<b>U VRIJEME POJAVE PRVIH PJEGA NA LISTU</b> 	■ <b>ARGO</b> 0,2 – 0,3 l/ha	pjegavost lista

**ARGO**<sup>®</sup> (difenkonazol 250 g/l)

**SISTEMIČNI FUNGICID IZ SKUPINE TRIAZOLA**

ARGO<sup>®</sup> je namijenjen za suzbijanje pjegavosti lista u:

### šećernoj repi

– u količini 0,2 – 0,3 l/ha. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 15 – 20 dana.



pjegavost lista  
šećerne repe



pjegavost lista  
šećerne repe

**MAVRIK**<sup>®</sup> **2 F** (tau-fluvalinat 240 g/l)

**KONTAKTNI INSEKTICID IZ SKUPINE PIRETROIDA**

MAVRIK<sup>®</sup> 2 F namijenjen je za suzbijanje crne repine uši u:

### šećernoj repi

– u količini 0,2 l/ha (20 ml na 1000 m<sup>2</sup>). Sredstvo se smije koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini u maksimalnoj količini do 0,6 l/ha po primjeni. Najmanji vremenski razmak između dvije primjene je 14 dana.

