






SOJA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



| VRIJEME PRIMJENE | PRIPRAVAK | SUZBIJA |
|---|---|---|
| OSNOVNO TRETIRANJE (nakon sjetve, a prije nicanja)  | ■ SIRTAKI 0,3 - 0,4 l/ha (30 - 40 ml/1000 m ²) | jednogodišnje širokolisne korove i pojedine jednogodišnje uskolisne korove |
| | ■ STOMP AQUA 2,5 - 3,0 l/ha | jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima |
| KOREKTIVNO TRETIRANJE (od 1-3 troliske soje)  | ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha jednokratno | jednogodišnje širokolisne korove |
| | ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha u split aplikaciji (1+1 l/ha uz dodatak okvašivača kod svake primjene) | jednogodišnje širokolisne korove i pojedine uskolisne korove |
| | ■ SIRTAKI 0,3 l/ha (30 ml/1000 m ²) uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha | biostimulator - regenerator mikrobiote tla |
| CILJANO TRETIRANJE (prema pojavi korova)  | ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha jednokratno | jednogodišnje širokolisne korove |
| | ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha u split aplikaciji (1+1 l/ha uz dodatak okvašivača kod svake primjene) | ■ AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha iii ■ BOMBARDIER 3 l/ha |





SOJA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



BASAGRAN® 480 (bentazon 480 g/l)

KONTAKTNI HERBICID

BASAGRAN® 480 namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (europskog mračnjaka, običnog šćira, ambrozije, jarmena, lobode, pastirske torbice, obične konice, bročike, kamilice, poljske potočnice, dvornika, divlje rotkve, poljske gorušice, crne pomoćnice, mišjakinje, dikice i dr. kada su razvijena 2 - 4 lista korova) u:

soji – između 1. i 3. troliske (BBCH 11 – 13) u količini 1,5 – 2 l/ha (150 – 200 ml u 20 – 40 l vode na 1.000 m²).

Prilikom uporabe sredstva mora se utrošiti najmanje 200 l vode/ha.



kamilica



pastirska torbica



NOVO:

SIRTAKI® (klomazon 360 g/l)

SELEKTIVNI ZEMLJIŠNI HERBICID

SIRTAKI® namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova (portulaka, bijele lobode, europskog mračnjaka, crne pomoćnice, običnog koštana, američkog prosa i muhara) u:

soji

- **nakon sjetve, a prije nicanja soje (pre-em)**
Primijeniti najkasnije do stadija BBCH 08 u količini 0,3 – 0,4 l/ha (30 – 40 ml/1000 m²)
- **nakon nicanja (post-em)**
Primijeniti u periodu do 4 razvijene troliske soje (BBCH 10-14) u količini 0,3 l/ha (30 ml/1000 m²).

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha.

Dozvoljeno je maksimalno jedno tretiranje u vegetaciji.



muhar



bijela loboda

