




SOJA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

| VRIJEME PRIMJENE | PRIPRAVAK | SUZBIJA |
|---|--|--|
| OSNOVNO TRETIRANJE (nakon sjetve, a prije nicanja)  | ■ AFALON DISPERZIJA 2,0-2,1 l/ha + ■ STOMP AQUA 2,5 - 3,0 l/ha | jednogodišnje širokolisne korove + jednogodišnje uskolisne korove |
| KOREKTIVNO TRETIRANJE (od 1-3 troliske soje)  | ■ CORUM 1,9 l/ha jednokratno ■ CORUM 1,9 l/ha u split aplikaciji (0,95 - 0,95 l/ha u razmaku 7-10 dana) ili | jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove |
| | ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha jednokratno ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha u split aplikaciji (1+1 l/ha uz dodatak okvašivača kod svake primjene) | jednogodišnje širokolisne korove |
| CILJANO TRETIRANJE (prema pojavi korova)  | ■ CORUM 1,9 l/ha jednokratno ■ CORUM 1,9 l/ha u split aplikaciji (0,95 - 0,95 l/ha u razmaku 7-10 dana) | jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove |



NAPOMENA:

Sredstvo CORUM ne primjenjivati u soji nakon stadija bočnih izdanaka (BBCH 21). Zbog bolje učinkovitosti preporuča se koristiti sredstvo u kombinaciji s okvašivačem DASH HC, sukladno uputi za primjenu sredstva navedenoj na etiketi i/ili popratnom listu.