




# ULJANA REPICA

## ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



### KARIS 10 CS (lambda-cihalotrin 100 g/l)

KARIS 10 CS je namijenjen za suzbijanje štetnika u:

- **repičinog crvenoglavog buhača** u količini 50 ml/ha, primjenom na početku napada štetnika, u razvojnim fazama BBCH 10-25, uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Dozvoljene su maksimalno 4 primjene godišnje, uz najmanje 10 dana razmaka između tretiranja.
- **kupusnih buhača i lisnih uši** prenosioca virusa zapadne žuticerepe (BWYV) u količini 75 ml/ha, primjenom na početku napada štetnika, u razvojnim fazama BBCH 10-25, uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene godišnje, uz najmanje 10 dana razmaka između tretiranja kod suzbijanja kupusnih buhača, odnosno 7 dana kod suzbijanja lisnih uši.
- **repičinog sjajnika** samo u područjima gdje nije prisutna rezistentnost na piretroide, repičine pipe komušarice i repičine mušice komušarice u količini 75 ml/ha primjenom u fazi cvjetnih pupova (BBCH 50 – 59), uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene godišnje, uz najmanje 7 dana između tretiranja.

### KONTAKTNO-ŽELUČANI INSEKTICID



repičin  
sjajnik



lisne  
uši

### TEBKIN 250 EW (tebukonazol 250 g/l)

TEBKIN 250 EW namijenjen je za suzbijanje bolesti u:

#### uljanoj repici:

- **koncentrične pjegavosti i bijele truleži** u količini 1 l/ha uz uporabu 200 – 500 l vode/ha primjenom od faze pojave cvjetnih pupova (BBCH 50) do faze početka razvoja komuški (BBCH 71)
- **suhe truleži** u količini 1 l/ha uz uporabu 200 – 500 l vode/ha primjenom u jesen, do faze 5 do 7 listova.

Sredstvo se na uljanoj repici može primijeniti najviše dva puta u vegetaciji. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, smije se primjenjivati samo jednom u jesen i jednom u proljeće.

### SISTEMIČNI FUNGICID PREVENTIVNOG I KURATIVNOG DJELOVANJA



pjegavost lista  
uljane repice



simptomi bijele truleži  
na stabljici uljane repice







# ULJANA REPICA

## ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
<b>JESENSKO TRETIRANJE</b> (od stadija kotiledona do oblikovanja rozete) 	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,1 l/ha	repičinog buhača, pipu terminalnog pupa
	■ <b>KARIS 10 CS</b> 50 ml/ha	repičinog crvenoglavog buhača
	■ <b>KARIS 10 CS</b> 75 ml/ha	kupusne buhače, lisne uši
	■ <b>TEBKIN 250 EW</b> 1 l/ha ■ <b>XTENDER ROW</b> 5 l/ha	suhu trulež biostimulator - regenerator mikrobiote tla
<b>PROLJETNO TRETIRANJE</b> (pred formiranje cvjetnih pupova) 	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,1 l/ha ili ■ <b>KARIS 10 CS</b> 75 ml/ha	repičinog sjajnika repičinu pipu komušaricu repičinu mušicu komušaricu
	■ <b>TEBKIN 250 EW</b> 1 l/ha	suhu trulež
	■ <b>AMALGEROL ESSENCE</b> 3 l/ha ili ■ <b>BOMBARDIER</b> 3 l/ha	biostimulator - smanjuje utjecaj stresa, povećava kvalitetu i kvantitetu plodova, pospješuje vegetativni rast

