










BRESKVA I NEKTARINA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
POČETAK OPADANJA LIŠĆA	<ul style="list-style-type: none"> ■ CUPRABLAU Z 35 WG 1,6 – 2,04 kg/ha (160 – 204 g / 1.000 m² / 100 l vode) 	kovrčavost, rupičavost lista i bakterijski rak
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GROW 25 – 50 g/biljci 	Prevenција i uklanjanje simptoma nedostatka željeza (ferokloroza)
 OD MIROVANJA DO VIDLJIVIH ČAŠKI	<ul style="list-style-type: none"> ■ CUPRABLAU Z 35 WG 1,6 – 2,04 kg/ha (160 – 204 g / 1.000 m² / 100 l vode) 	kovrčavost, rupičavost lista i bakterijski rak
	+	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ mineralno ulje ■ STOMP AQUA 2,5 – 3,0 l/ha ■ HERKULES 3 – 8 l/ha 	zimske stadije štetnika jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i uskolisne korove
 POJAVA CVJETOVA	<ul style="list-style-type: none"> ■ SYLLIT 544 SC 1,65 l/ha (165 ml / 1.000 m² / 100 l vode) ■ ARGO 0,02 – 0,03% (20 – 30 ml u 100 l vode) 	kovrčavost lista breskve kovrčavost lista, moniliju (palež grančica)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ZIRAM 76 WG 2,5 kg/ha (250 g / 1.000 m² / 100 l vode) ■ LAINCOIL 0,75 – 1% (0,75 – 1 l / 100 l vode) 	kovrčavost lista breskve kalifornijske štítaste uši i dudove štítaste uši
	+	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ BRAI 0,04 – 0,05% (40 – 50 ml / 1.000 m² / 100 l vode) 	
 POČETAK CVATNJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIGNUM 0,056 – 0,075% (56 – 75 g na 100 l vode) 	moniliju (sušenje rodni grančica), palež cvijeta
 ZAVRŠETAK CVATNJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIGNUM 0,056 – 0,075% (56 – 75 g na 100 l vode) ■ ARGO 0,02 – 0,03% (20 – 30 ml u 100 l vode) 	moniliju (sušenje rodni grančica), palež cvijeta kovrčavost lista, moniliju (palež grančica)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ZIRAM 76 WG 2,5 kg/ha (250 g / 1.000 m² / 100 l vode) iii ■ SYLLIT 544 SC 1,65 l/ha (165 ml / 1.000 m² / 100 l vode) 	kovrčavost lista breskve
 FORMIRANI PLOD	<ul style="list-style-type: none"> ■ ARGO 0,02 – 0,03% (20 – 30 ml u 100 l vode) 	kovrčavost lista, moniliju (palež grančica)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ SAVIAL FORTE 1,2 l/ha (120 ml / 1.000 m² / 100 l vode) 	pepelnicu, smeđu trulež plodova
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DELAN 700 WDG 0,5 – 0,7 kg/ha (50 – 70 g / 1.000 m² / 100 l vode) ■ CHROMOSUL 80 0,3 – 0,4% (300 – 400 g na 100 l vode) 	šupljikavost lista breskve pepelnicu
	<ul style="list-style-type: none"> ■ AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha iii ■ BOMBARDIER 3 l/ha 	biostimulator - smanjuje utjecaj stresa i povećava kvalitetu plodova
 RAST PLODA	<ul style="list-style-type: none"> ■ DELAN 700 WDG 0,5 – 0,7 kg/ha (50 – 70 g / 1.000 m² / 100 l vode) ■ SAVIAL FORTE 1,2 l/ha (120 ml / 1.000 m² / 100 l vode) ■ CHROMOSUL 80 0,3 – 0,4% (300 – 400 g na 100 l vode) 	šupljikavost lista breskve pepelnicu, smeđu trulež plodova pepelnicu
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ROTOR SUPER 350 – 490 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha 	breskvin moljac mediteransku voćnu muhu lisne uši
	<ul style="list-style-type: none"> ■ IMIDAN 50 WG 1,5 kg/ha (150 g / 1.000 m² / 100 l vode) 	mediteransku voćnu muhu, breskvinog savijača, breskvinog moljca
	<ul style="list-style-type: none"> ■ PRIMOR 50 WG 0,04 – 0,06 % (40 – 60g na 100 l vode) 	lisne uši



BRESKVA I NEKTARINA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



PREPORUKA:

LAINCOIL® (parafinsko ulje 790 g/l)

LAINCOIL® je namjenjen za suzbijanje štetnika u:

breskvi - kalifornijske štitaste uši i dudove štitaste uši u koncentraciji 0,75 – 1% (0,75 – 1 l/100 l vode), uz utrošak vode 500 – 1500 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje prije početka cvatnje (BBCH 53).

Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.

Sadrži parafinsko ulje koje djeluje mehanički, gušenjem štetnika.

LAINCOIL® se ne smije miješati sa sredstvima koja sadrže sumpor, polisulfide, kaptan i folpeta.

KONTAKTNO-ŽELUČANI INSEKTICID



simptomi napada
na plodu breskve



simptomi napada
na kori breskve

ARGO® (difenkonazol 250 g/l)

ARGO® je namijenjen za suzbijanje bolesti:

breskve – kovrčavosti lista u količini 20 – 30 ml u 100 l vode.

Sredstvo se primjenjuje od početka razvoja listova, najviše 2 – 3 puta.

Za suzbijanje **paleži grančica i trulež plodova** u količini 20 – 30 ml u 100 l vode.

Sredstvo se može primjenjivati 1 – 2 puta prije berbe.

PREVENTIVNI I KURATIVNI SISTEMIČNI FUNGICID



trulež
ploda breskve



simptomi kovrčavosti
lista breskve



NOVO:

SYLLIT 544 SC (dodin 544 g/l)

SYLLIT 544 SC je namjenjen za suzbijanje biljnih bolesti:

breskve – kovrčavosti lista u količini od 1,65 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od bubrenja pupova (BBCH 01) do otpadanja peteljki (BBCH 69) i/ili kasnije kada je 50% listova otpalo pa do jeseni.

PREVENTIVNI I KURATIVNI FUNGICID LOKALNE SISTEMIČNOSTI



simptomi kovrčavosti
lista breskve



simptomi
na plodu breskve



NOVO I PREPORUKA:

CUPRABLAU Z 35 WG (bakarni oksiklorid 350 g/kg)

Pakiranje od 100 g registrirano je i za neprofesionalne korisnike (amateure).

CUPRABLAU Z 35 WG je namjenjen za suzbijanje bolesti:

breskve – kovrčavosti lista breskve, šupljikavosti, smeđe truleži, krastavosti, uz popratni učinak na **bakterijsku pjegavost i bakterijski rak** u količini od 1,6 – 2,04 kg/ha uz utrošak vode 500 – 1500 l/ha

Sredstvo se na koštičavom voću koristi u mirovanju vegetacije, od jeseni do faze bubrenja pupova. Količinu (dozu) je potrebno prilagoditi pritisku bolesti. Sredstvo se na breskvi, nektarini i marelici smije primijeniti 4 puta tijekom vegetacijskog ciklusa, uz minimalni razmak od 7-10 dana između primjena.

KOMBINIRANI SISTEMIČNO KONTAKTNI FUNGICID



simptomi truleži
ploda breskve



simptomi paleži cvijeta i izboja
na breskvi