








# MASLINA

## ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	NAPOMENA
 <b>MIROVANJE VEGETACIJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CUPRABLAU Z 35 WG</b> 1,6 – 2,2 kg/ha (160 – 220 g / 1.000 m<sup>2</sup> / 100 l vode)</li> <li>+</li> <li>■ <b>SUGOBY</b> 0,015 – 0,02 % (15 – 20 g na 100 l vode)</li> </ul>	paunovo oko, bakterijski rak i čađavice	prskati nakon berbe maslina (listopad, studeni)
 <b>DO KRETANJA VEGETACIJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CUPRABLAU Z 35 WG</b> 1,6 – 2,2 kg/ha (160 – 220 g / 1.000 m<sup>2</sup> / 100 l vode)</li> <li>+</li> <li>■ <b>SUGOBY</b> 0,015 – 0,02 % (15 – 20 g na 100 l vode)</li> <li>+</li> <li>■ <b>mineralno ulje</b></li> </ul>	paunovo oko bakterijski rak i čađavice	prskanje provesti od sredine veljače do polovine ožujka
<b>OD RAZVOJA LISTA DO ZAVRŠETKA CVATNJE</b>	■ <b>SYLLIT 544 SC</b> 1,25 – 1,65 l/ha (125 – 165 ml / 1.000 m <sup>2</sup> / 100 l vode)	paunovo oko i antraknozu ploda	prskanje provesti od faze kada je prvi list rastvoren do završetka cvatnje masline
 <b>PLODIĆI VELIČINE ZRNA PŠENICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>IMIDAN 50 WG</b> 1,5 kg/ha (150 g / 1.000 m<sup>2</sup> / 100 l vode) <b>iii</b></li> <li>■ <b>BATURAD WP</b> 1,0 kg/ha (100 g / 1000 m<sup>2</sup> / 100 l vode)</li> <li>■ <b>SYLLIT 544 SC</b> 1,25 – 1,65 l/ha (125 – 165 ml / 1.000 m<sup>2</sup> / 100 l vode)</li> </ul>	maslininog moljca	prskati prije ili poslije berbe (jesen)
 <b>ODRVENJAVANJE KOŠTUNICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ROTOR SUPER</b> 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>IMIDAN 50 WG</b> 1,5 kg/ha (150 g / 1.000 m<sup>2</sup> / 100 l vode)</li> </ul>	maslininu muhu	



### NAPOMENA:

- U stresnim uvjetima tijekom vegetacije (prije mraza, nakon tuče, suša, nakon duljeg perioda hladnijeg vremena) preporučamo koristiti biostimulatore AMALGEROL ESSENCE 3 l/ha ili BOMBARDIER 3 l/ha.



### NOVO:

## SUGOBY

(krezoksim-metil 500 g/kg)

### LOKALNO SISTEMIČNI FUNGICID TRANSLAMINARNOG DJELOVANJA

SUGOBY namjenjen je za suzbijanje bolesti u:

**maslini – paunovog oka** u količini 0,2 kg/ha, uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha (0,015 – 0,02%; 15 – 20 g na 100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od stadija stvaranja cvata do početka otvaranja cvjetnih pupova (BBCH 50 - 55). Sredstvo se smije koristiti najviše dva puta tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 14 dana.



simptomi paunovog oka na listu masline




simptomi paunovog oka na listu masline



# MASLINA

## ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



### PREPORUKA:

#### IMIDAN 50<sup>®</sup> WG (fosmet 500 g/kg)

IMIDAN 50<sup>®</sup> WG je namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u:

**maslini – maslinine muhe i maslininog moljca** u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha.

Za suzbijanje maslinine muhe sredstvo se primjenjuje kada su plodovi postigli 50% svoje završne veličine (početak lignifikacije koštice) (BBCH 75) sukladno karenci. Može se primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije uz razmak između primjena 10 dana.

Sredstvo se može primijeniti za suzbijanje prve cvjetne generacije maslinovog moljca u fazi kada su latice zeleno obojene i više su od čaške (BBCH 57), a za drugu generaciju u fazi kada su plodovi postigli 10% od svoje završne veličine (BBCH 71).

#### KONTAKTNO-ŽELUČANI INSEKTICID



maslinina muha



simptomi napada maslinine muhe

#### CUPRABLAU Z 35 WG (bakarni oksiklorid 350 g/kg)



Pakiranje od 100 g registrirano je i za neprofesionalne korisnike (amateure).

CUPRABLAU Z 35 WG je namijenjen za suzbijanje bolesti:

**masline – paunovog oka, bakterijskog raka i čađavica** u količini od 1,6 – 2,2 kg/ha uz utrošak vode 1000 – 1500l/ha.

Sredstvo se na maslini smije primijeniti 3 puta tijekom vegetacijskog ciklusa uz minimalni razmak od 7 – 10 dana između primjena.

#### PREVENTIVNI KONTAKTNI FUNGICID I BAKTERICID



simptomi napada paunovog oka masline



simptomi napada paunovog oka masline



### PREPORUKA:

#### ROTOR<sup>®</sup> SUPER (deltametrin 25 g/l)

ROTOR<sup>®</sup> SUPER je namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u:

**maslini**

– **maslinine muhe i maslininog moljca i maslininog medića** u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha kod pojave štetnika.

– **lisne buhe** u količini 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 – 1400 l/ha.

Dopuštena je maksimalno 1 primjena godišnje.

#### KONTAKTNO- ŽELUČANI INSEKTICID



maslinin medić



simptomi napada maslinine muhe